

平成24年度

単独不活化ポリオワクチン

平成24年9月1日より経口生ワクチンが
不活化ポリオワクチン（皮下注射）に変わりました。

【対象者】

生後3か月から生後90か月（7歳6か月）未満

【接種方法】

標準的な接種期間

初回接種①②③：生後3か月から生後12か月

20日から56日の間隔をおいて3回接種（皮下注射）

*追加接種：初回③終了後6か月以上の間隔をおいて1回

標準的な接種期間（初回③終了後12～18か月に達するまでの期間）


（追加接種については、平成24年9月1日現在で、有効性・安全性が確立していないため、
定期接種の対象外です）

【接種費用】無料

【接種期間】通年

どうすればいいの？ポリオワクチン

単独の不活化ポリオワクチン導入（平成24年9月1日予定）から、4種混合ワクチン導入までの接種ステップ



☆20日以上おいて（20日から56日までの間隔をおくことが望ましいです）

★6か月以上おいて（12か月から18か月の間隔をおくことが望ましいです）

※平成24年9月1日の導入時点では、4回目の追加接種は定期接種対象外です（現在、国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定）。

（ 〇 ）
厚 衛 生 省

問い合わせ先

吹田市立保健センター 予防接種担当

TEL 6339-1212

FAX 6339-7075

吹田市・吹田市医師会

H24.9